

التقويم الزراعي لأهم المزروعات في سورية لشهر كانون الثاني الخبرات الأكاديمية السورية - الخدمات - التقويم الزراعي

إعداد: د. عبد المنعم العبود

الكلمات المفتاحية: التقويم الزراعي، شهر كانون الثاني، المحاصيل الحقلية، الأشجار المثمرة، محاصيل الخضر.

المحتويات:

- مقدمة
- التقويم الزراعي لأهم المحاصيل الحقلية في سورية لشهر كانون الثاني
- التقويم الزراعي لأهم الأشجار المثمرة في سورية لشهر كانون الثاني
- التقويم الزراعي لأهم محاصيل الخضر في سورية لشهر كانون الثاني

مقدمة:

يعتبر شهر كانون الثاني أحد أهم أشهر السنة الزراعية في سورية، ففي هذا الشهر يتم إعداد وتحضير الأرض والبدء بزراعة العديد من المحاصيل الحقلية كالعس والحمص، والكمون، وحب البركة، واليانسون. وفي مجال الأشجار المثمرة يتم الانتهاء من قطاف ثمار الزيتون المتأخرة النضج، والبدء بإضافة الأسمدة العضوية والفوسفورية والبيوتاسية وبعد ذلك يتم إجراء الحراثة السطحية لبساتين الأشجار المثمرة، وأيضاً يتم البدء بزراعة غراس الأشجار المثمرة في الأرض الدائمة، والقيام بعمليات التقليم اللازمة. أما في مجال محاصيل الخضر يتم إعداد وتحضير الأرض والبدء بزراعة البطاطا في العروة الربيعية، وكذلك يتم البدء بزراعة البذور في المشاتل للحصول على شتول البندورة والباذنجان والفليفلة، وأيضاً يتم خلال هذا الشهر الاستمرار بقطاف القرنيط والملفوف والفجل واللفت والسلق، والسبانخ، والبقدونس والجرجير. ونورد في هذه النشرة الزراعية التقويم الزراعي لأهم المزروعات في سورية لشهر كانون الثاني.

المحاصيل الحقلية

المحصول	الخدمة المطلوبة	موعد تقديم الخدمة (يوم)
القمح	إعطاء رية بعد الزراعة (حسب نوع التربة والظروف المناخية السائدة في المنطقة).	15 - 01
	البدء بمكافحة الأعشاب الضارة في حقول القمح، وننصح باستخدام مبيدات الأعشاب المتخصصة، بعد استشارة المختصين باستخدامها، كما ننصح بقراءة التعليمات الموجودة على عبوة المبيد.	31-15
	مكافحة فأر الحقل (وذلك من خلال: مكافحة الأعشاب الضارة على جوانب الطرق وأقنية الري، واستخدام المصائد على أطراف الحقول المزروعة، واستخدام الطعوم السامة في الجحور الفعالة).	31-01
الشعير	إعطاء رية بعد الزراعة (حسب نوع التربة والظروف المناخية السائدة في المنطقة).	15 - 01
	البدء بمكافحة الأعشاب الضارة في حقول الشعير، وننصح باستخدام مبيدات الأعشاب المتخصصة، بعد استشارة المختصين باستخدامها، كما ننصح بقراءة التعليمات الموجودة على عبوة المبيد.	31-15
	مكافحة فأر الحقل (وذلك من خلال: مكافحة الأعشاب الضارة على جوانب الطرق وأقنية الري، واستخدام المصائد على أطراف الحقول المزروعة، واستخدام الطعوم السامة في الجحور الفعالة).	31-01
العدس	البدء بزراعة العدس في هذا الشهر، ويتراوح معدل البذار للدونم الواحد بين 9-12 كغ في الأصناف صغيرة البذرة، وبين 17-19 كغ في الأصناف كبيرة البذرة، وننصح بمعاملة البذور بالمبيدات الفطرية والحشرية المناسبة قبل الزراعة.	31 - 01
الحمص	البدء بزراعة الحمص الشتوي.	15 - 01
القطن	-	-
الذرة الصفراء	-	-
الفاول العادي	القيام بعملية الترقيع للجور الغائبة (بعد 2-3 أسابيع من الزراعة).	15 - 01
	إعطاء رية بعد القيام بعملية الترقيع.	15 - 01
الفاول السوداني	-	-

-	-	فول الصويا
31-15	إجراء حراثة سطحية للتربة، وإضافة الأسمدة العضوية، وطمرها خلال عملية الحراثة (من منتصف كانون الثاني وحتى منتصف شباط).	التبغ
15 - 01	إضافة الدفعة الثانية من الأسمدة الآزوتية، بعد عملية التفريد الأولى (عروة خريفية).	الشوندر السكري
31 - 01	تروى الأرض حسب الحاجة، وحسب كمية الأمطار الهاطلة (عروة خريفية).	
15 - 01	نثر جميع كميات الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية ونصف كمية الأسمدة الآزوتية قبل الزراعة، وقلبها في التربة على عمق 20 سم. يضاف للدونم الواحد: 44 كغ يوريا تركيز 46 % و 26 كغ سوبر فوسفات ثلاثي 46% و 24 كغ سلفات البوتاسيوم 50% (عروة شتوية).	
15 - 01	تخطط الأرض إلى خطوط تبعد عن بعضها 45-50 سم، و15-20 سم بين النبات والآخر (عروة شتوية).	
31-15	البدء بزراعة الشوندر في العروة الشتوية	
31-15	إعطاء رية الإنبات بعد الزراعة مباشرة (عروة شتوية).	
-	-	دوار الشمس
-	-	السهم
31 - 01	الاستمرار بزراعة الكمون في هذا الشهر (يعتبر هذا الشهر الموعد الأمثل لزراعة الكمون في سورية)، ويحتاج الدونم الواحد 2-2.5 كغ بذور. وينصح باستخدام البذور المعتمدة والمعقمة بالمبيدات الفطرية المتخصصة.	الكمون
31 - 01	الاستمرار بزراعة حبة البركة في هذا الشهر. وينصح باستخدام البذور المعتمدة والمعقمة بالمبيدات الفطرية المتخصصة.	حبة البركة
31 - 01	الاستمرار بزراعة اليانسون في هذا الشهر (يحتاج الدونم الواحد 1.5-2 كغ بذور). وينصح باستخدام البذور المعتمدة والمعقمة بالمبيدات الفطرية المتخصصة.	اليانسون
31 - 01	إعطاء رية بعد الزراعة (حسب نوع التربة والظروف المناخية السائدة في المنطقة).	
-	-	القرطم

الأشجار المثمرة

المحصول	الخدمة المطلوبة	موعد تقديم الخدمة (يوم)
الزيتون	الانتهاء من قطاف ثمار الزيتون المتأخرة النضج، وعصرها مباشرة، وعدم تركها في المعصرة لفترة طويلة.	01 - 15
	إضافة الأسمدة العضوية والفوسفاتية والبوتاسية وذلك بعد الانتهاء من عملية قطاف ثمار الزيتون في بداية الشتاء، ويضاف للدونم الواحد لأشجار الزيتون في طور الإثمار الكميات التالية من الأسمدة: 3-5 متر مكعب من السماد البلدي المتخمر بشكل جيد، مرة كل 3 سنوات، و06-10 كغ سماد سوبر فوسفات ثلاثي تركيز 46% و 16-24 كغ سماد سلفات البوتاسيوم تركيز 50%.	15 - 31
	إجراء حراثة سطحية (10-12) سم بعد إضافة الأسمدة العضوية والفوسفاتية والبوتاسية، وذلك بعد الانتهاء من عملية قطاف ثمار الزيتون مباشرة.	15 - 31
	الاستمرار بزراعة غراس الزيتون في الأرض الدائمة.	01 - 31
	الاستمرار بزراعة غراس اللوز في الأرض الدائمة.	01 - 31
اللوز	يفضل إعطاء رية في هذا الشهر في حال عدم هطول الأمطار.	01 - 31
	إجراء حراثة سطحية وذلك للاستفادة من الأمطار الهاطلة في هذا الشهر.	01 - 31
الفسق الحلي	زراعة غراس الفسق الحلي في الأرض الدائمة (التقيد بزراعة أعداد الأشجار المذكرة والمؤنثة لشجرة الفسق الحلي بمعدل 10/1 شجرة).	01 - 31
	زراعة غراس التفاح في الأرض الدائمة. ونصح بأن تكون هذه الغراس موثوقة الأصل والصنف، وخالية من الآفات الحشرية والمرضية.	01 - 31
التفاح	رش الأشجار بمحلول اليوريا 46% بمعدل 10 كغ/100 لتر ماء للدونم الواحد للوقاية من مرض جرب التفاح. بعد ذلك يتم جمع الأوراق المتساقطة وحرقها.	01 - 15
	القيام بعمليات التقليم المطلوبة لأشجار التفاح، ويتم ذلك في طور الراحة، وبعد سقوط الأوراق ب 20 يوم وحتى ما قبل انتفاخ البراعم).	01 - 31
	إجراء رشة بالزيت الشتوي مع مركب نحاسي ومبيد حشري (بعد الانتهاء من عمليات التقليم).	15 - 31
	البدء بعمليات التقليم المطلوبة لأشجار العنب.	01 - 31
	إجراء حراثة سطحية (في حال لم تتم عملية الحراثة في شهر كانون الأول)، وذلك للاستفادة من الأمطار الهاطلة في هذا الشهر.	01 - 31
العنب	إجراء حراثة سطحية (في حال لم تتم عملية الحراثة في شهري تشرين الثاني وكانون الأول)، وذلك للاستفادة من الأمطار الهاطلة في هذا الشهر.	01 - 15

الكرز		
البرتقال	31 - 01	الاستمرار بقطاف ثمار الأصناف الناضجة.
	31 - 01	تقليم الأغصان المتكسرة وإزالة الأفرع اليابسة وحرقها.
	15 - 01	إضافة الأسمدة العضوية بمعدل 3-5 طن للدونم الواحد (في حال عدم التسميد في شهري تشرين الثاني وكانون الأول).
	15 - 01	إضافة الأسمدة الفوسفورية والبوتاسية (في حال عدم التسميد في شهري تشرين الثاني وكانون الأول)، ويضاف للشجرة الواحدة في طور الإثمار 0.5 كغ سوبر فوسفات ثلاثي 46% و 1 كغ سلفات البوتاسيوم 50%.
	31 - 01	يمكن الرش بالمبيدات الفطرية للوقاية من الأمراض الفطرية (في حال عدم الرش في شهر كانون الأول).
	31 - 01	زراعة الغراس في الأرض الدائمة. وننصح بأن تكون هذه الغراس موثوقة الأصل والصنف، وخالية من الآفات الحشرية والمرضية.
	31 - 01	أخذ الاحتياطات الخاصة لحماية البساتين من خطر الصقيع.
المشمش	31 - 01	الاستمرار بزراعة الغراس في الأرض الدائمة. وننصح بأن تكون هذه الغراس موثوقة الأصل والصنف، وخالية من الآفات الحشرية والمرضية.
	31 - 01	الاستمرار بعمليات التقليم (تقليم التربية أو الإثمار).
	31 - 15	إجراء رشة بالزيت الشتوي مع مركب نحاسي ومبيد حشري.
التين	15 - 01	إجراء حراثة سطحية (في حال لم تتم عملية الحراثة في شهري تشرين الثاني وكانون الأول)، حيث تلعب هذه الحراثة دوراً هاماً، حيث تزداد رطوبة الأرض، وتحتفظ التربة بهذه الرطوبة لفترة طويلة.
	31 - 01	الاستمرار بقطاف ثمار الأصناف الناضجة.
الليمون	31 - 01	تقليم الأغصان المتكسرة وإزالة الأفرع اليابسة وحرقها.
	15 - 01	إضافة الأسمدة العضوية بمعدل 3-5 طن للدونم الواحد (في حال عدم التسميد في شهري تشرين الثاني وكانون الأول).
	15 - 01	إضافة الأسمدة الفوسفورية والبوتاسية (في حال عدم التسميد في شهري تشرين الثاني وكانون الأول)، ويضاف للشجرة الواحدة في طور الإثمار 0.5 كغ سوبر فوسفات ثلاثي 46% و 1 كغ سلفات البوتاسيوم 50%.
	31 - 01	يمكن الرش بالمبيدات الفطرية للوقاية من الأمراض الفطرية (في حال عدم الرش في شهر كانون الأول).
	31 - 01	زراعة الغراس في الأرض الدائمة. وننصح بأن تكون هذه الغراس موثوقة الأصل والصنف، وخالية من الآفات الحشرية والمرضية.
	31 - 01	الاستمرار بقطاف ثمار الأصناف الناضجة.

31 - 01	أخذ الاحتياطات الخاصة لحماية البساتين من خطر الصقيع.	
31 - 01	الاستمرار بزراعة الغراس في الأرض الدائمة. ونصح بأن تكون هذه الغراس موثوقة الأصل والصنف، وخالية من الآفات الحشرية والمرضية.	الدراق
31 - 01	الاستمرار بعمليات التقليم (تقليم التربية أو الإثمار).	
31 - 15	إجراء رشة بالزيت الشتوي مع مركب نحاسي ومبيد حشري.	
31 - 01	إضافة الأسمدة الفوسفورية والبوتاسية (في حال عدم التسميد في شهري تشرين الثاني وكانون الأول)، ومن ثم إجراء حراثة سطحية للتربة.	الرمان
31 - 01	زراعة غراس الإجاز في الأرض الدائمة. ونصح بأن تكون هذه الغراس موثوقة الأصل والصنف، وخالية من الآفات الحشرية والمرضية.	الإجاز
31 - 01	القيام بعمليات التقليم المطلوبة لأشجار الإجاز، ويتم ذلك في طور الراحة، وبعد سقوط الأوراق ب 20 يوم وحتى ما قبل انتفاخ البراعم).	
31 - 15	إجراء رشة بالزيت الشتوي مع مركب نحاسي ومبيد حشري (بعد الانتهاء من عمليات التقليم).	
15 - 01	إضافة الأسمدة العضوية والفوسفاتية والبوتاسية (في حال لم تتم عملية التسميد في شهري تشرين الثاني وكانون الأول).	الجوز
15 - 01	إجراء حراثة سطحية (في حال لم تتم عملية الحراثة في شهري تشرين الثاني وكانون الأول)، وتأتي أهمية هذه الحراثة في التأثير الجيد لإمتصاص الجذور للسماد، وكذلك في القضاء على الأعشاب الضارة، وتهوية التربة (لاينصح بالحراثة في فترات الصقيع الحرجة).	

محاصيل الخضر

المحصول	الخدمة المطلوبة	موعد تقديم الخدمة (يوم)
البطاطا	البدء بإعداد وتحضير بذار البطاطا للزراعة، وكسر طور السكون للدرنات، وتثبيت البراعم.	15 - 01
	إجراء الحراثة الأخيرة لعمق 30-35 سم، في النصف الثاني من هذا الشهر.	31 - 15
	إضافة الأسمدة الكيماوية: الفوسفاتية والبوتاسية والدفعة الأولى من الأسمدة الأزوتية (ثلث الكمية)، وخلطها في التربة لعمق 30 سم. ويضاف للدونم الواحد عند زراعة البطاطا في العروة الربيعية: (5 وحدة صافية من الأزوت أي ما يعادل 11 كغ يوريا 46% أو 15 كغ نترات أمونيوم 33% و 12 وحدة صافية من الأسمدة الفوسفاتية أي ما يعادل 26 كغ سوبر فوسفات ثلاثي 46% و 12 وحدة صافية	31 - 15

	من الأسمدة البوتاسية أي ما يعادل 24 كغ من سلفات البوتاسيوم 50%).	
31 - 15	تترك أرض الحقل معرضة لأشعة الشمس لمدة يومين أو ثلاثة أيام، ثم تتم عمليتي التنعيم والتسوية، وبعد ذلك تخطط حسب مسافات الزراعة المرغوبة.	
31 - 15	تقسم الأرض الى خطوط بعرض 60-75 سم بين الخط والآخر، أما ضمن الخط الواحد فتكون المسافة بين النبات والآخر بين 25-30 سم (المسافة بين الجور).	
31 - 15	البدء بزراعة بذار البطاطا (التقاوي) اعتباراً من 15 كانون الثاني (عروة ربيعية).	
31 - 15	البدء بزراعة البذور لإنتاج شتول البندورة ضمن المشتل.	البندورة
31 - 15	البدء بزراعة البذور لإنتاج شتول الفليفلة ضمن المشتل.	الفليفلة
31 - 15	البدء بزراعة البذور لإنتاج شتول الباذنجان ضمن المشتل.	الباذنجان
-	-	البطيخ الأحمر
-	-	البطيخ الأصفر
15 - 01	إجراء حراثة عميقة متعامدة للتربة، يضاف خلالها السماد العضوي المتخمر بشكل جيد بمعدل (2-4) م ³ للدونم.	البصل العادي
31 - 01	تنظيم عملية الري بمعدل مرة كل (8-10) أيام، وذلك حسب نوع التربة والظروف المناخية السائدة (درجة الحرارة ونسبة الرطوبة).	الثوم
-	-	الخيار
-	-	الكوسا
-	-	الفاصولياء
31 - 01	الاستمرار بعملية الري بمعدل 10-12 يوم، وذلك حسب نوع التربة والظروف المناخية السائدة (درجة الحرارة ونسبة الرطوبة).	البازلاء
-	-	البامياء
31 - 01	الاستمرار في قلع محصول الجزر في الزراعة المتأخرة، ويتراوح إنتاج الدونم الواحد بين (4-6) طن.	الجزر
31 - 15	إجراء حراثة سطحية للتخلص من بقايا المحصول.	
31 - 01	البدء بعملية حش البقدونس عند وصول النباتات لارتفاع حوالي (15) سم. وتكرر عملية الحش مرة كل (20-30) يوم.	البقدونس
31 - 01	الاستمرار بعملية الري بمعدل 10-12 يوم، وذلك حسب نوع التربة والظروف المناخية السائدة (درجة الحرارة ونسبة الرطوبة).	
31 - 01	الاستمرار بعملية قطاف الثمار في الزراعة المتأخرة.	القرنبيط
31 - 01	الاستمرار بعملية قطاف الثمار في الزراعة المتأخرة.	الملفوف

31 - 01	الاستمرار بعملية الري بمعدل 10-12 يوم، وذلك حسب نوع التربة والظروف المناخية السائدة (درجة الحرارة ونسبة الرطوبة).	اللفت
31 - 01	الاستمرار بقلع اللفت (تنضج جذور اللفت بعد 45-60 يوم من الزراعة)، ومن علامات النضج كبر حجم الجذور، ويتم قلع الجذور باليد، وتقطع الأوراق وتغسل جيداً لإزالة الأتربة. ويعطي الدونم الواحد من 2-2.5 طن إذا زرع اللفت في الموعد الملائم.	
31 - 01	الاستمرار بعملية الري بمعدل 10-12 يوم، وذلك حسب نوع التربة والظروف المناخية السائدة (درجة الحرارة ونسبة الرطوبة).	الفجل
31 - 01	الاستمرار بقلع النباتات ذات الجذور الكبيرة أولاً، وتغسل الجذور بعد قلعها وتربط في حزم صغيرة (ويعطي الدونم الواحد من 2-2.5 طن إذا زرع الفجل في الموعد الملائم، وتختلف هذه الكمية باختلاف الأصناف وموعد الزراعة).	
31 - 01	يمكن الاستمرار بزراعة الفجل في عروات عديدة.	
31 - 01	الاستمرار بعملية الري بمعدل 10-12 يوم (يجب الري بعد كل حشة مباشرة)، وذلك حسب نوع التربة والظروف المناخية السائدة (درجة الحرارة ونسبة الرطوبة).	السبانخ
31 - 01	الاستمرار بجمع محصول الأوراق من الصنف البلدي (عندما يتكون للنبات 5-6 أوراق كبيرة). وتسقى النباتات بعد كل حشة لضمان نمو أوراق جديدة. ويبلغ إنتاج الدونم ما بين 1-2 طن للحشة الواحدة، وتختلف هذه الكمية باختلاف الأصناف وموعد الزراعة).	
31 - 01	الاستمرار بعملية الري بمعدل 10-12 يوم (يجب الري بعد كل حشة مباشرة)، وذلك حسب نوع التربة والظروف المناخية السائدة (درجة الحرارة ونسبة الرطوبة).	السلق
31 - 01	الاستمرار بجمع محصول الأوراق من الصنف البلدي (تؤخذ أول حشة بعد 40-60 يوم من الزراعة). ويستمر الحش كل 20 يوم مرة، ويفضل التسميد والري بعد كل حشة لضمان نمو أوراق جديدة. ويبلغ إنتاج الدونم ما بين 1-1.5 طن للحشة الواحدة، وتختلف هذه الكمية باختلاف الأصناف وموعد الزراعة).	
31 - 01	يجب تنظيم عملية الري بحسب الحاجة وهطول الأمطار. مع التأكيد على ضرورة تقليل كميات الري عند الاقتراب من النضج.	الخس
31 - 01	الاستمرار بجمع محصول الخس بعد وصول النبات إلى الحجم المناسب.	
31 - 01	زراعة بذور الخس في أرض المشتل من أجل الزراعة في العروة الربيعية.	
-	-	الملوخية
31 - 01	تنظيم عملية الري بمعدل مرة كل (10-12) أيام، وذلك حسب نوع التربة والظروف المناخية السائدة.	الجرجير



31 - 15	البدء بعملية حش الجرجير عند وصول النباتات لارتفاع حوالي (15) سم. وتكرر عملية الحش مرة كل (20-30) يوم.
---------	---



**Academics
& Experts**
for Sustainable
Development

حقوق النشر

جميع حقوق النشر محفوظة للخبرات الأكاديمية السورية - يجوز طباعة هذا البحث أو أي جزء منه أو نسخه أو ترجمته بإذن خطي من الناشر .