

التقويم الزراعي لأهم المزروعات في سورية لشهر شباط الخبرات الأكاديمية السورية - الخدمات - التقويم الزراعي

إعداد: د. عبد المنعم العبود

الكلمات المفتاحية:

التقويم الزراعي، شهر شباط، المحاصيل الحقلية، الأشجار المثمرة، محاصيل الخضر.

المحتويات:

- مقدمة
- التقويم الزراعي لأهم المحاصيل الحقلية في سورية لشهر شباط
- التقويم الزراعي لأهم الأشجار المثمرة في سورية لشهر شباط
- التقويم الزراعي لأهم محاصيل الخضر في سورية لشهر شباط

مقدمة:

يعتبر شهر شباط من أهم أشهر السنة الزراعية في سورية، ففي هذا الشهر يتم إستكمال زراعة العديد من المحاصيل الحقلية (العدس، الحمص الربيعي والشوندر الربيعي)، وكذلك يتم إضافة الدفعة الثانية من الأسمدة الأزوتية لبعض المحاصيل (القمح والشعير)، والقيام بعمليات التعشيب لمحاصيل أخرى (الكمون، حبة البركة واليانسون). وفي مجال الأشجار المثمرة يتم في هذا الشهر زراعة غراس معظم الأشجار المثمرة في الأرض الدائمة، والقيام بعمليات التقليم اللازمة، وكذلك يتم القيام برش معظم الأشجار المتساقطة الأوراق بالزيوت الشتوية المخلوطة مع المركبات النحاسية والمبيدات الحشرية (اللوز، المشمش، الدراق، الكرز، التفاح، الفستق الحلبي، العنب وغيرها). أما في مجال محاصيل الخضر يتم زراعة البطاطا في العروة الربيعية، وكذلك يتم زراعة بصيالات القزح لإنتاج البصل العادي، ويتم أيضاً زراعة بذور بعض الخضر في المشاتل للحصول على الشتول (البندورة، الباذنجان، الفليفلة والتبغ وغيرها)، وأيضاً يتم خلال هذا الشهر الاستمرار بقطاف وحش الخضر الورقية (السلق والسبانخ والبقدونس والجرجير والخس وغيرها)، ونورد في هذه النشرة الزراعية التقويم الزراعي لأهم المزروعات في سورية لشهر شباط.

التقويم الزراعي لأهم المحاصيل الحقلية

المحصول	الخدمة المطلوبة	موعد تقديم الخدمة (يوم)
القمح	مكافحة الأعشاب الضارة في حقول القمح، ونصح باستخدام مبيدات الأعشاب المتخصصة، بعد استشارة المختصين باستخدامها، كما ننصح بقراءة التعليمات الموجودة على عبوة المبيد.	15-01
	الاستمرار بمكافحة فأر الحقل.	15-01
	إضافة الدفعة الثانية من الأسمدة الآزوتية في طور الإشتاء (التفرع أو التفريخ)، ويضاف للدونم الواحد 5 وحدات آزوت نقي وهي تعادل 11 كغ يوريا تركيز 46 %، وإعطاء رية بعد إضافة هذه الأسمدة (حسب حسب نوع التربة والظروف المناخية السائدة في المنطقة).	28-15
	البدء بعمليات الكشف الحقل، والتحري عن الإصابة بالأمراض والحشرات، وخاصة أمراض الأصداء (الصدأ الأصفر)، وذلك في الظروف المناخية المناسبة لظهور هذا المرض، مثل درجات الحرارة المعتدلة والرطوبة العالية.	28-15
الشعير	مكافحة الأعشاب الضارة في حقول الشعير، ونصح باستخدام مبيدات الأعشاب المتخصصة، بعد استشارة المختصين باستخدامها، كما ننصح بقراءة التعليمات الموجودة على عبوة المبيد.	15-01
	الاستمرار بمكافحة فأر الحقل.	15-01
	إضافة الدفعة الثانية من الأسمدة الآزوتية في طور الإشتاء (التفرع أو التفريخ)، ويضاف للدونم الواحد حوالي 10-11 كغ يوريا تركيز 46 %، وإعطاء رية بعد إضافة هذه الأسمدة (نوع التربة والظروف المناخية السائدة في المنطقة).	28-15
العدس	استكمال عملية الزراعة في بعض المناطق، ويتراوح معدل البذار للدونم الواحد بين 9-12 كغ في الأصناف صغيرة البذرة، وبين 17-19 كغ في الأصناف كبيرة البذرة، ونصح بمعاملة البذور بالمبيدات الفطرية والحشرية المناسبة قبل الزراعة.	15 - 01
الحمص	البدء بزراعة الحمص الربيعي.	28 - 01
القطن	-	-
الذرة الصفراء	-	-

15 - 01	القيام بعملية العزيق والتعشيب.	الفول العادي
28 - 15	إعطاء رية بعد القيام بعملية العزيق والتعشيب (حسب نوع التربة والظروف المناخية السائدة في المنطقة).	
-	-	الفول السوداني
-	-	فول الصويا
15-01	زراعة بذور التبغ في المساكب المناسبة.	التبغ
28-15	إجراء حراثة سطحية للتربة، وإضافة الأسمدة العضوية، وطمورها خلال عملية الحراثة (من منتصف كانون الثاني وحتى منتصف شباط).	
15 - 01	القيام بعملية التفريد النهائية والتعشيب (عروة خريفية)، وينصح بالرش بسماد البورون.	الشوندر السكري
15 - 01	تروى الأرض حسب الحاجة، وحسب كمية الأمطار الهاطلة (عروة خريفية).	
28 - 15	القيام بعمليات العزيق والتحصين ومكافحة الآفات إن وجدت للعروة الخريفية.	
15 - 01	الانتهاء من الزراعة في العروة العروة الشتوية.	
28-15	القيام بعمليات الترقيع للجور الغائبة في العروة العروة الشتوية.	
28-15	نثر جميع كميات الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية ونصف كمية الأسمدة الآزوتية قبل الزراعة، وقلبها في التربة على عمق 20 سم. يضاف للدونم الواحد: 44 كغ يوريا تركيز 46 % و 26 كغ سوبر فوسفات ثلاثي 46% و 24 كغ سلفات البوتاسيوم 50% (عروة ربيعية).	
28-15	البدء بالزراعة في العروة الربيعية.	
28-15	إعطاء رية الإنبات الخفيفة بعد الزراعة مباشرة (عروة ربيعية).	
-	-	دوار الشمس
-	-	السهم
28 - 15	القيام بعملية التعشيب، وإضافة الدفعة الثانية من السماد الآزوتي (يضاف للدونم الواحد 5 كغ يوريا تركيز 46%).	الكمون

28-15	القيام بعملية التعشيب، وإضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتي (يضاف للدونم الواحد 10 كغ يوريا تركيز 46%).	حبة البركة
28-15	القيام بعملية التعشيب، وإضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتي (يضاف للدونم الواحد 5 كغ يوريا تركيز 46%).	اليانسون
28-01	تهيئة التربة المخصصة للزراعة في العروة الربيعية، حيث تتم حرثة عميقة 30 سم باتجاهين، ثم ينثر السماد البلدي المتخمر وقلبه بالتربة بشكل جيد قبل الزراعة (3 متر مكعب للدونم الواحد)، ويضاف 14-12 كغ سماد سوبر فوسفات ثلاثي 46% و7-8 كغ سماد بوتاسي 50%، ثم تنعم الأرض.	القرطم

التقويم الزراعي لأهم الأشجار المثمرة

المحصول	الخدمة المطلوبة	موعد تقديم الخدمة (يوم)
الزيتون	القيام بعملية تقليم أشجار الزيتون.	28 - 01
	الاستمرار بزراعة غراس الزيتون في الأرض الدائمة.	28 - 01
	يفضل إعطاء رية للبساتين المروية في هذا الشهر في حال عدم هطول الأمطار.	28 - 15
اللوز	الاستمرار بزراعة غراس اللوز في الأرض الدائمة.	28 - 01
	القيام بعملية تقليم أشجار اللوز (تقليم تربية وإثمار).	15 - 01
	رش الأشجار بالزيوت الشتوية مع مبيد حشري.	15 - 01
الفسق الحلي	القيام بعملية تقليم أشجار الفسق الحلي (تقليم خفيف).	28 - 01
	زراعة غراس الفسق الحلي في الأرض الدائمة (التقيد بزراعة أعداد الأشجار المذكورة والمؤنثة لشجرة الفسق الحلي بمعدل 10/1 شجرة).	28 - 01
	رش الأشجار بالزيوت الشتوية مع مبيد حشري.	15 - 01
	إضافة دفعة من الأسمدة الأزوتية، والقيام بري الأشجار بعد هذه الإضافة.	28 - 15
التفاح	الاستمرار بعمليات التقليم المطلوبة لأشجار التفاح، ويتم ذلك في طور السكون (سكون العصارة).	15 - 01

28 - 15	إجراء رشة بالزيت الشتوي مع مركب نحاسي ومبيد حشري (بعد الانتهاء من عمليات التقليم).	
15 - 01	الاستمرار بعمليات التقليم المطلوبة لأشجار العنب.	العنب
28 - 15	إجراء رشة بالزيت الشتوي مع مركب نحاسي ومبيد حشري (بعد الانتهاء من عمليات التقليم).	
28 - 01	الاستمرار بزراعة الغراس في الأرض الدائمة. ونصح بأن تكون هذه الغراس موثوقة الأصل والصنف، وخالية من الآفات الحشرية والمرضية.	الكرز
15 - 01	الاستمرار بعمليات التقليم (تقليم التربية أو الإثمار).	
28 - 15	إجراء رشة بالزيت الشتوي مع مركب نحاسي ومبيد حشري.	
28 - 01	الاستمرار بقطاف ثمار الأصناف الناضجة.	البرتقال
28 - 01	تقليم الأغصان المتكسرة وإزالة الأفرع اليابسة وحرقتها.	
28 - 01	زراعة الغراس في الأرض الدائمة. ونصح بأن تكون هذه الغراس موثوقة الأصل والصنف، وخالية من الآفات الحشرية والمرضية.	
28 - 01	أخذ الاحتياطات الخاصة لحماية البساتين من خطر الصقيع.	
28 - 01	الاستمرار بزراعة الغراس في الأرض الدائمة. ونصح بأن تكون هذه الغراس موثوقة الأصل والصنف، وخالية من الآفات الحشرية والمرضية.	المشمش
15 - 01	الاستمرار بعمليات التقليم (تقليم التربية أو الإثمار).	
28 - 15	إجراء رشة بالزيت الشتوي مع مركب نحاسي ومبيد حشري.	
28 - 01	زراعة غراس التين في الأرض الدائمة. ونصح بأن تكون هذه الغراس موثوقة الأصل والصنف، وخالية من الآفات الحشرية والمرضية.	التين
28 - 01	الاستمرار بقطاف ثمار الأصناف الناضجة.	الليمون
28 - 01	تقليم الأغصان المتكسرة وإزالة الأفرع اليابسة وحرقتها.	
28 - 01	زراعة الغراس في الأرض الدائمة. ونصح بأن تكون هذه الغراس موثوقة الأصل والصنف، وخالية من الآفات الحشرية والمرضية.	
28 - 01	أخذ الاحتياطات الخاصة لحماية البساتين من خطر الصقيع.	

28 - 01	الاستمرار بزراعة الغراس في الأرض الدائمة. وننصح بأن تكون هذه الغراس موثوقة الأصل والصنف، وخالية من الآفات الحشرية والمرضية.	الدراق
15 - 01	الاستمرار بعمليات التقليم (تقليم التربية أو الإثمار).	
28 - 15	إجراء رشة بالزيت الشتوي مع مركب نحاسي ومبيد حشري.	
28 - 01	زراعة غراس الرمان في الأرض الدائمة. وننصح بأن تكون هذه الغراس موثوقة الأصل والصنف، وخالية من الآفات الحشرية والمرضية.	الرمان
15 - 01	القيام بعمليات التقليم المطلوبة لأشجار الرمان، ويتم ذلك في طور السكون (طور الراحة).	
28 - 01	زراعة غراس الإجاص في الأرض الدائمة. وننصح بأن تكون هذه الغراس موثوقة الأصل والصنف، وخالية من الآفات الحشرية والمرضية.	الإجاص
15 - 01	القيام بعمليات التقليم المطلوبة لأشجار الإجاص، ويتم ذلك في طور السكون (طور الراحة).	
28 - 15	إجراء رشة بالزيت الشتوي مع مركب نحاسي ومبيد حشري (بعد الانتهاء من عمليات التقليم).	
28 - 01	زراعة غراس الجوز في الأرض الدائمة. وننصح بأن تكون هذه الغراس موثوقة الأصل والصنف، وخالية من الآفات الحشرية والمرضية.	الجوز

التقويم الزراعي لأهم محاصيل الخضر

المحصول	الخدمة المطلوبة	موعد تقديم الخدمة (يوم)
البطاطا	زراعة تقاوي البطاطا في الحقل إذا لم تتم زراعتها في شهر كانون الثاني، حيث يمكن زراعتها حتى 15 شباط.	15 - 01
البندورة	الاستمرار بزراعة البذور لإنتاج شتول البندورة ضمن المشتل.	28 - 01
الفليفلة	الاستمرار بزراعة البذور لإنتاج شتول الفليفلة ضمن المشتل.	28 - 01
الباذنجان	الاستمرار بزراعة البذور لإنتاج شتول الباذنجان ضمن المشتل.	28 - 01
البطيخ الأحمر	-	-

-	-	البطيخ الأصفر
15 - 01	نثر جميع كميات الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية وثلث كمية الأسمدة الآزوتية قبل الزراعة، وقلبها في التربة على عمق 20 سم. يضاف للدونم الواحد: 20 كغ يوريا تركيز 46 % و 35 كغ سوبر فوسفات ثلاثي 46% و 20 كغ سلفات البوتاسيوم 50%.	البصل العادي
28 - 15	البدء بزراعة القزح لإنتاج البصل العادي.	
28 - 15	إعطاء رية بعد الزراعة مباشرة.	
28 - 15	تنظيم عملية الري بمعدل مرة كل (10-12) يوم، وذلك حسب نوع التربة والظروف المناخية السائدة (درجة الحرارة ونسبة الرطوبة). إجراء عمليات التعشيب (حسب الحاجة).	الثوم
-	-	الخيار
-	-	الكوسا
-	-	الفاصولياء
28 - 01	الاستمرار بعملية الري بمعدل 10-12 يوم، وذلك حسب نوع التربة والظروف المناخية السائدة (درجة الحرارة ونسبة الرطوبة).	البازلاء
28 - 15	القيام بعملية العزيق والتعشيب.	
-	-	البامياء
-	-	الجزر
28 - 01	الاستمرار بعملية حش البقدونس عند وصول النباتات لارتفاع حوالي (15) سم. وتكرر عملية الحش مرة كل (20 - 30) يوم.	البقدونس
28 - 01	الاستمرار بعملية الري بمعدل 10-12 يوم، وذلك حسب نوع التربة والظروف المناخية السائدة (درجة الحرارة ونسبة الرطوبة).	
-	-	القرنبيط
-	-	الملفوف
28 - 01	الاستمرار بعملية الري بمعدل 10-12 يوم، وذلك حسب نوع التربة والظروف المناخية السائدة (درجة الحرارة ونسبة الرطوبة).	اللفت

28-01	الاستمرار بقلع اللفت (تنضج جذور اللفت بعد 45-60 يوم من الزراعة).	
28-01	الاستمرار بعملية الري بمعدل 10-12 يوم، وذلك حسب نوع التربة والظروف المناخية السائدة (درجة الحرارة ونسبة الرطوبة).	الفجل
28-01	الاستمرار بقلع النباتات ذات الجذور الكبيرة أولاً، وتغسل الجذور بعد قلعها وتربط في حزم صغيرة.	
28-01	يمكن الاستمرار بزراعة الفجل في عروات عديدة.	
28-01	الاستمرار بعملية الري بمعدل 10-12 يوم (يجب الري بعد كل حشة مباشرة)، وذلك حسب نوع التربة والظروف المناخية السائدة (درجة الحرارة ونسبة الرطوبة).	السبانخ
28-01	الاستمرار بجمع محصول الأوراق من الصنف البلدي (عندما يتكون للنبات 5-6 أوراق كبيرة). وتسقى النباتات بعد كل حشة لضمان نمو أوراق جديدة.	
28-01	الاستمرار بعملية الري بمعدل 10-12 يوم (يجب الري بعد كل حشة مباشرة)، وذلك حسب نوع التربة والظروف المناخية السائدة (درجة الحرارة ونسبة الرطوبة).	السلق
28-01	الاستمرار بجمع محصول الأوراق من الصنف البلدي، ويستمر الحش كل 20 يوم مرة، ويفضل التسميد والري بعد كل حشة لضمان نمو أوراق جديدة. ويبلغ إنتاج الدونم ما بين 1-1.5 طن للحشة الواحدة، وتختلف هذه الكمية باختلاف الأصناف وموعد الزراعة.	
28-01	الاستمرار بجمع محصول الخس بعد وصول النبات إلى الحجم المناسب.	الخس
28-01	زراعة بذور الخس في أرض المشتل من أجل الزراعة في العروة الربيعية.	
-	-	الملوخية
28-01	تنظيم عملية الري بمعدل مرة كل (10-12) أيام، وذلك حسب نوع التربة والظروف المناخية السائدة.	الجرجير
28-01	الاستمرار بعملية حش الجرجير عند وصول النباتات لارتفاع حوالي (15) سم. وتكرر عملية الحش مرة كل (20-30) يوم.	



**Academics
& Experts**
for Sustainable
Development

حقوق النشر

جميع حقوق النشر محفوظة للخبرات
الأكاديمية السورية - يجوز طباعة هذا
البحث أو أي جزء منه أو نسخه أو ترجمته
بإذن خطي من الناشر .